

ビタミンE配合

パップクール

第3類医薬品

膏体と粘着シートの一休構造

うちみ

ねんざ

肩こり

腰痛

粘着シート

膏体

微香性


ワンタッチ
タイプ

8枚入

パップクール

(鎮痛消炎薬) 第3類医薬品

ワンタッチタイプ
ネット+ハップをドッキング



はがしぐちテープを取り除いて貼ってください。



4 940794 461365



配置期限

ロット番号

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部位には使用しないこと
①目の周囲、粘膜等。②湿疹、かぶれ、傷口。

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成分及び分量 膏体100.0g中

dl-カンフル0.200g
l-メントール0.300g
サリチル酸グリコール1.000g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.300g
添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロースナトリウム、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、香料を含有します。

製造販売元  大協薬品工業株式会社
富山市水橋島等173

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法及び用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)粘着テープ等がかぶれやすい人は使用しないでください。
- (4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用を控えてください。

[保管及び取り扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後はファスナーを閉めて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口
電話：076-479-1313
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 電話：0120-149-931

8枚入 (11.8cm×7.5cm)

¥1,200+税 PP