

肩こり、腰痛、筋肉痛

↓ここからあけて下さい

水性
タイプ

開封口

やさしいはり薬です。

肩こり、腰痛 筋肉痛に

消炎鎮痛剤

第3類医薬品

コリシート
「クールタイプ」

Cool

はりやすい

片手で貼れる
プasterサイズ

8枚入

微香性でソフトな貼り心地



消炎鎮痛剤

8枚入

配置期限

ロット番号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)



▲ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 次の部位には使用しないこと
 (1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果 打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労
用法及び用量 1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部に貼ってください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1)用法及び用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)粘着テープ等がかぶれやすい人は使用しないでください。(4)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。(5)多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性があるため、使用を控えてください。

成分及び分量 膏体100g中

メントール	0.300g
サリチル酸グリコール	1.000g
トコフェロール酢酸エステル	0.300g

添加物として、D-ソルビトール液、濃グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、カルメロスナトリウム、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリソルベート80、亜硫酸水素ナトリウム、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、モノオレイン酸ソルビタン、青色1号を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話:076-479-1313
 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

5.3cm×7.9cm 8枚入

製造販売元  大協薬品工業株式会社

富山市水橋筋等173

¥500+税

肩こり、腰痛、筋肉痛

コリシート

第3類医薬品

